W *""• l(3 •^ GO CO
O "^ o
o-f
1 Si
CO
^ so
X
O 01 ___ _ ___
..... ." ^JH Q
r~ CM O
0 l~ ^
rH
0 <ri £* 1

C S I
°
1
O l
rM CO rH l"^ ' r-H Ti x rH ^ T ,y rH •'•' CO O
p C O c ^ T — 1
pq
to ||

CO CO
vf*L HI]
>p II
CD D ? ? ^j co co M 5«5 ^ c pq o r-T 6*0 r-T c^i X^ X JUa?s 1 —.p.. WO
.....
1 - .....
CO Ol Ol CO 01 o II II ri o> i5
a 2s 60 X flj

r C H O
c O sj -l t- " ~ s h
1
C i ' • <
! " C O r H
G O r- ^ ,
1
5 •*> pq fc ® '*" "^ O 3 a™ S -f3 .-«' o f/l CJ

6 0 w r H	O JSq rn" JijO V» ,2)^ o en Ol OJ O rH		» '^ « too II ~~ co -0 r! •o o X x x «r r. Ol CO O I-	r^ o PH C3i J^SJ 0-1 ^ ji A. P - - >o o o			1 1« O ^ J*j IS CD '' g ^0 „•" apt,	
	"' '. ,(^ ' _, £^	C 5	r— O	CO CO O CO	O l	< y *\ t o	rjl .2 "*	
	-3 CO CO O fl O^ CM O^ >O r-T	1 » 1 ^ "	Ol CO Co"rH>	O '0 o m" 1 **' ^ p^ II ^l erf1 i- r_j v X ^ <i> 6*0 S PH 44 co i^. TH 60 n x ^ %" CO rH S SI co :p H ^ 0 -H	< H H o o "	^ 	

			rH 01 ^				
	""J'o ..... g ..... "" "o	o " >					
	Q CO 0s! CO	o	oi 0 Cft O	o: o >o *o	o O l	5 "	9.^' ^.fS
	I*'	G O "	CO*"	0 ,| cf		r H	tisS' ^O
				'v ^ ||		™ | ™	Afl (H r§ d fHrr t OJJ ^
3 3	o 0		<D	6*0 e °«u w •^ O "Q V			^SP " "5? 2o rt,5 tcV, 2- f*^ p "
r H	2* 6b2		&b co ||	3O *-• S CD			55? ^-
	X -^ X Ol rH rH e"5 f»L| (j^		O-1 ' "I kO H v v^ co IGQ A A c/ >O 1 O*l Ol Ol r-	II m ^ tb J 00 CO ^r^l H ^ 6 01			q'F« ^ l^s aS Sg^ 3
	* jd • *-* * * o — S? * ±3 ca «w O '? -8 i§c£ C g 'M " "«H " 6)0 '^3 ^ ° ^	. 4 - 1 fl s • g	d .2 0 "Q CD <£> ^5 -2	« o o • O • rH	. ^	. 	i$>' ^ (U ^ isi . Ul5 •35 2$ «5(/

	•H a •"£ .2*«c/5 O W 03 -+J CSj "*—*' •S i -f -.-il ' 0} M K^ "T, « •^N- •g ? -i o SO o CjD 1 . Q_J hri	M ^ p	•- Q5 O*	^S		J H		5 O 0) 8 biua -d ti-M ^ ^U ^ «
			Total energy con! J^nergy absorbed Haduction of Fe-i1 Eaduction of Pe,2 "RaQrtf -i/vn -	! 1 X, CD 1 1° I I		d C D g I	8) 1 o -"	1 Assumed to be FeO, inasmuch as 1 2 0'33=